



**CURSO DE INSEMINACIÓN
ARTIFICIAL POST CERVICAL**
"¿CÓMO IMPLEMENTAR LA TÉCNICA CON ÉXITO Y NO FALLAR EN EL INTENTO?"

Puedes elegir...

Reproducir en Spotify

Reproducir en YouTube

[O continuar leyendo la última revisión](#) ↓

Con el concepto claro sobre el **Cérvix** (Capítulo 3 y 4) podremos comprender con exactitud que el padrillo **NO** debe encontrarse al frente de la cerda en el momento de la inseminación. Esto provocará la contracción del mismo y dificultará el paso de la sonda para atravesarlo.

Aún existen casos en granja que aplican la técnica con el padrillo en frente de la cerda. Esto puede responder la pregunta **¿Por qué veo sangre cuando retiro el catéter?** Además de otras razones como, por ejemplo, fuimos demasiados bruscos o no esperamos el suficiente tiempo de relajación para introducir la sonda del catéter y provocó una laceración o herida en la mucosa durante el paso del cérvix. Y, ¿Qué consecuencias trae esto? Lo veremos más adelante en preguntas frecuentes sobre Post-Cervical.

Capítulo 5:

16. PADRILLO. Debe pasar por gestación para detectar el celo de las hembras. El **concepto clave** es simple, si ya pasó, debemos esperar 45 minutos para que ocurra la **relación del cérvix** (capítulo 3, punto 11) en la hembra a inseminar de modo post-cervical.

Nota: En granjas grandes, esperar 45 minutos para comenzar la inseminación puede ser inviable. Por lo tanto, puede comenzar mucho antes, es importante simplemente reconocer que el cérvix no esté en estado de contracción para facilitar el paso de la sonda.

17. ¿SI PASÓ HACE MÁS DE 45 MINUTOS? Nada. Si pasa más tiempo, una hora o más, solo podremos observar que las hembras ya se encuentran todas acostadas y puede costar un poco más mantenerlas de pie para inseminarlas.

18. ¿ES RECOMENDABLE PASARLO LUEGO DE INSEMINAR?

Hay profesionales que lo recomiendan. Podríamos suponer que, una vez entregado el semen, el estímulo del padrillo provocará por un lado la contracción del cérvix y por el otro la contracción del útero que ayudará al transporte seminal. Hasta la fecha, no disponemos de demasiados estudios que indiquen que hacerlo contribuirá a la mejora en los resultados. Si implica demasiados movimientos de acuerdo a la rutina de la granja y no hay mejoras observables, ¿Conviene?

19. CONVIVENCIA. Como dijimos en el capítulo 4 sobre nulíparas, requieren una atención especial. Este curso se enfoca en llevar la post cervical con éxito a la práctica. Por lo tanto, preferimos que sea aplicada en adultas (sin padrillo al frente) y nulíparas de modo convencional o tradicional (con

post-cervical (razones explicadas en capítulo 3 y en preguntas frecuentes más adelante) y, para no modificar el “protocolo de inseminación”, debemos inseminar igual. En ese caso, lo agregaremos como “observaciones” en la planilla de registro pero, la forma de inseminar será convencional o lo que es igual, tradicional.

20. ORGANIZAR EL PASO DEL PADRILLO.

Depende cuantas veces al día se esté haciendo detección de celo (una o dos) u otros factores de acuerdo a la organización de la gestación. Es importante que, primero intentes pensar una rutina de acuerdo a tu caso, será más fácil comprenderlo. Para ello, utiliza los conceptos claves vistos hasta el momento y siguiendo los siguientes pasos:

21. ADAPTANDO LA RUTINA EN GRANJA.

1° Paso: Toma una hoja y escribe de modo resumido la rutina que se está aplicando en gestación como, por ejemplo: Primero, las cerdas toman agua. Segundo, realizamos limpieza. Tercero, se pasa el padrillo para detección de celo. Etc...

2° Paso: Resalta en amarillo los momentos en los que el padrillo pasa por frente de las hembras, ya sea para detección de celo o para inseminación tradicional.

3° Paso: Agrega con otro color, momentos en los que puedes esperar 45min. entre el paso del padrillo y la aplicación de post-cervical en adultas. Esos momentos se convertirán en los adecuados para aplicar la técnica. En bonus track presentamos ejemplos.

Si quieres compartirnos tu rutina o realizar alguna consulta envíanos un correo a vet@genox.com.ar o d.tecnico@genox.com.ar

padrillo al frente). Entonces, pueden **convivir** ambas técnicas en la granja.

Bonus track:

Además, puede ocurrir que existan casos en los que **no hemos podido** aplicar la técnica

Compartimos algunas opciones de cómo puedes organizar la rutina del paso del padrillo en el siguiente [enlace](#).

Este mail es parte del [Curso de Inseminación Post - Cervical de Genox](#), basado en la experiencia práctica de su [autor](#). Puedes consultar la [bibliografía utilizada](#). Cualquier sugerencia, completar [en este formulario](#). Comparte este curso a las personas que creas que le será útil.

Por dudas o consultas puedes escribirnos un correo a d.tecnico@genox.com.ar o [vet@genox.com.ar](mailto:veter@genox.com.ar) con el asunto: "CIAPC consulta".



GENOX

